



Titel: Overvågning af rødrygget tornskade <i>Lanius collurio</i> som ynglefugl			
Dokumenttype: Teknisk anvisning	TA. nr.: A183	Version: 1	Oprettet: 20.03.2018
Forfattere: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet	Gyldig fra: 01.05.2018		
	Sider: 7		
	Sidst ændret: 04.2018		
TA henvisninger			

## 0 Indhold

1 Indledning .....	2
2 Metode .....	2
2.1 Tid, sted og periode.....	2
2.2 Udstyr .....	3
2.3 Procedure.....	3
2.3.1 Stam- og kortdata .....	3
2.3.2 Observationer og overvågningsdata .....	3
3 Databehandling .....	4
4 Kvalitetssikring.....	5
4.1 Kvalitetssikring af data og dataaflevering.....	5
5 Referencer .....	5
6 Bilag .....	5
6.1 Feltskema .....	5
7 Oversigt over versionsændringer .....	7

Udgået dokument  
se senere version

## 1 Indledning

Formålet med denne tekniske anvisning (TA) er at angive en kvalitetssikret, standardiseret og reproducerbar metode til at gennemføre overvågningen af ynglende rødrygget tornskade.

Rødrygget tornskade yngler i en række åbne, varierede habitater med buskadser, enkeltstående træer, levende hegn osv., som eksempelvis overdrev, klitheder, græsningsenge og ryddede arealer i skov. De danske rødrygget tornskader er trækfugle, som overvintrer i Øst – og Sydafrika.

Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1.

## 2 Metode

Overvågning af rødrygget tornskade foretages gennem optælling af ynglepar i de EF-Fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i områdernes udpegningsgrundlag.

Overvågningen af rødrygget tornskade er kategoriseret som Intensiv 1. Intensiv 1 står for opsøgende overvågning af artens bestandsstørrelse. Overvågningen består af en basisovervågning, der omfatter bestandsstørrelse og udbredelse i de EF-Fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget.

På feltskemaet til overvågning af rødrygget tornskade (bilag 6.1) er der fortrykte felter til angivelse af de parametre, der skal overvåges.

### 2.1 Tid, sted og periode

Rødrygget tornskade eftersøges hvert andet år (2018 og 2020).

Overvågning af ynglefugle i felten gennemføres i perioden 1. juni – 10. juli. Dage med vedvarende regn, tåge eller blæst er uegnede til feltobservationer og skal undgås.

Lokaliteter, der undersøges for ynglende rødrygget tornskade, består af kendte ynglelokaliteter for arten samt potentielle ynglelokaliteter. Potentielle områder udgøres af åbne områder som eksempelvis overdrev, klitheder, græsningsenge og ryddede arealer i skov med tornede buskadser, enkeltstående træer, levende hegn o.l. som tornskaden benytter som udkigspost efter byttedyr.

Ynglepar der observeres i forbindelse med anden overvågning uden for det

fastsatte overvågningsvindue (1. juni til 10. juli) kan medtages såfremt forekomsten kan henføres til sikre eller sandsynlige ynglepar.

## 2.2 Udstyr

Ved optælling medbringes håndkikkert (7-12 X forstørrelse). Derudover medbringes GPS, kompas, kort eller ortofoto til positionering af observationer, feltskema og skriveredskaber eller felttablet.

## 2.3 Procedure

### 2.3.1 Stam- og kortdata

Inden ynglesæsonen udarbejdes en oversigt over relevante ynglelokaliteter. Oversigten udarbejdes på baggrund af lokal viden suppleret i rimeligt omfang med viden om rødrygget tornskades forekomst i Danmark herunder offentliggjorte artikler, atlaskortlægning og DOFbasen, eller kontakter til lokale. Oversigten holdes løbende ajourført og danner grundlag for følgende års overvågninger af arten.

Ynglelokalitetens stednavn, inventør, indsamlingsformål og dato registreres på feltskema (bilag 6.1). Hvis ynglelokaliteten ikke har et officielt stednavn som fremgår af kort fra Geodatastyrelsen, navngives ynglelokaliteten med henvisning til nærmeste stednavn, fx "Ulithede 1 km øst for Slettestrand (rødrygget tornskade)".

Arealet på lokaliteten, hvor arten eftersøges, indtegnes som polygon på feltkort (landkort eller ortofoto) til efterfølgende registrering i Naturdatabasen. Såvel positive observationer som 0-observationer på egnede ynglelokaliteter registreres i Naturdatabasen.

### 2.3.2 Observationer og overvågningsdata

Hele fuglebeskyttelsesområdet gennemgås systematisk på orthofotos og alle umiddelbart velegnede åbne områder udvælges til feltbesøg. Det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på, at overvågningen foregår inden for afgrænsningen af fuglebeskyttelsesområdet.

I yngleperioden har hannen ofte faste udkigsposter, hvorfra den hævder territoriet og spejder efter byttedyr. Rugningen foregår i juni og i juli kan familiegupper observeres. Varslende par høres i juni og juli, især i sidste halvdel af perioden.

Vær opmærksom på at der både kan være uparrede hanner og hunner, hvis yngleforsøg er mislykkedes, og som ofte ses hjælpe med at beskytte og fodre andre pars unger. Hertil kommer at sene kuld ofte er overladt til en enkelt forældrefugl, hvilket også kan lede til en fejlvurdering af antallet af ynglepar i et område.

Observationer af rødrygget tornskade markeres på feltkortet med bemærkninger om adfærd og udseende, som indikerer at fuglen er i færd med en ynglecycklus. Evt. redefund markeres ligeledes på feltkortet. Ud fra de indsamlede oplysninger gives en samlet vurdering af, om der er tale om et sikkert eller sandsynligt ynglepar. Definitionerne på disse kategorier følger med enkelte tilføjelser Grell (1998):

Sikkert ynglefund:

- Fund af frisk brugt rede fra samme år
- Gamle fugle der bærer ekskrementer i næbbet
- Gamle fugle, der flyver til og fra rede under omstændigheder (ex. føde til unger), der tyder på, at reden er besat
- Rede med æg eller friske æggeskaller
- Familiegrupper

Sandsynligt ynglefund:

- Syngende, stationær man hørt i ynglesæsonen
- Fugle der tydeligt hævder territorium
- Parringsadfærd
- Redebyggende fugle
- Fugle, der samler redemateriale eller ses med redemateriale i næbbet

Hvis arten ikke yngler på den undersøgte lokalitet skrives "0" under "Antal ynglepar i område (polygon)".

Det overvågede areal indtegnes på kort til digitalisering som polygon i Danmarks Naturdata.

### 3 Databehandling

Data fra feltskemaet (Bilag 6.1) overføres til indtastningsfladen for "Ynglefugle, samlegruppe" i NaturAppl (programmet downloades fra Miljøportalens hjemmeside).

Hvis lokaliteten har været overvåget før, anvendes så vidt muligt samme polygon som sidst. Vælg "Kopier fra eksisterende sted" i NaturAppl.

Vejledning til NaturAppl mm. Findes på Miljøportalens hjemmeside:

<http://www.miljoportal.dk/Dokumenter%20alle/Vejledning%20til%20NaturAppl.pdf>

Registreringer af rødrygget tornskade, som FDC-Bio måtte gøre under overvågnings eller forskningsaktiviteter, vil være til rådighed for Miljøstyrelsen.

Ved indtastning i databasen overføres det overvågede område fra feltkort til Naturdatabasen.

#### **4 Kvalitetssikring**

##### **4.1 Kvalitetssikring af data og dataaflevering.**

Den datatekniske anvisning for kvalitetssikring af terrestriske NOVANA-data i Naturdatabasen omfatter kvalitetssikringsprocedurer for selve indtastnings- og redigeringsprocessen samt det videre forløb i forbindelse med godkendelse af data.

Se den datatekniske anvisning her:

[http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/DN01\\_Naturdata.pdf](http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/DN01_Naturdata.pdf)

#### **5 Referencer**

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag. 825 s.

#### **6 Bilag**

##### **6.1 Feltkema**

Bilag 6.1 se næste side

## BILAG 6.1

## Ynglefugle, samlegruppe – rødrygget tornskade

Version 1 gældende fra 01.05.2018

## Stamdata

Dato:	Indsamlingsformål:
	Inventør:

## Kortdata

Stednavn:

Det undersøgte/overvågede område indtegnes på kort til senere registrering som polygon i Naturdatabasen.

## Overvågningsdata

Antal ynglepar:			
Sikkert	Sandsynlig	Har ialt	Bemærkninger

## 7 Oversigt over versionsændringer

Version	Dato	Emne:	Ændring:
1	03.2018	Intensiv 1	Arten går fra Ekstensiv overvågning til Intensiv 1.

Udgået dokument  
se senere version